

NITRO-MAX[®]
Tus cultivos pueden más

N

NITRÓGENO FOLIAR
altamente asimilable +
extracto de algas

 **AddVise**

Mayor retorno de la inversión

Nitro-Max es un fertilizante foliar de alta eficiencia, formulado con nitrógeno asimilable y enriquecido con extracto de *Macrocyctis pyrifera*, *Durvillaea antarctica* y *Ulva lactuca*, algas marinas con efectos bioestimulantes naturales.

BENEFICIOS DIFERENCIALES

- Estimula el crecimiento foliar y radicular, mejorando la cobertura de praderas.
- Mejora la recuperación post-pastoreo o post-corte.
- Aumenta la resistencia al estrés hídrico y térmico.
- Compatible con programas de producción sustentable.
- Favorece la fotosíntesis y la absorción de nutrientes.

	DOSIS	RECOMENDACIÓN
Praderas	8a10L/Há	Aplicar en otoño o primavera en praderas en activo crecimiento, repitiendo cada 10-15 días. Realizar 2 aplicaciones por temporada.
Brassicas Forrajeras (Nabos, Coles, Raps, Rutabaga)		Aplicar con desarrollo de segundo par de hojas hasta roseta, Repetir 10-20 días después junto a insecticidas.
Achicoria Forrajera	10 L/Há	Aplicar al estado desarrollo 6 hojas y luego repetir 10 a 12 días después de cada pastoreo, 3 aplicaciones por temporada.
Trigo primaveral y Trigo candeal	3a10L/Há	Aplicar desde inicio de macolla hasta plena macolla (Z20-Z25), Aplicar desde primer nudo (Z3.1) hasta hoja bandera (Z6.0). Realizar 2-3 aplicaciones por temporada.
Maíz grano y silo		Aplicar cuando el cultivo tenga entre V4 y V8. Repetir en floración (estados VT a R1).
Maiz dulce y semillero		Aplicar cuando el cultivo tenga entre V4 y V8. Repetir en floración (estados VT a R1) junto a fungicidas y/o insecticidas.
Raps		Aplicar en estado de roseta, tallo floral y repetir en floración en caso de ser necesario. Realizar 2-4 veces en la temporada.
Lupino		Aplicar desde etapas iniciales del desarrollo vegetativo hasta floración, repitiendo cada 10-14 días. Realizar 2-3 aplicaciones por temporada.
Canola (semillero)		Aplicar en estado de roseta, tallo floral y repetir en floración en caso de ser necesario. Puede aplicarse junto a fungicidas y/o insecticidas.
Girasol/ Maravilla (semillero)		Aplicar durante el desarrollo vegetativo, entre estado V6 y antesis, repitiendo en cuaja. Realizar 2-3 aplicaciones por temporada.
Remolacha y Achicoria		Aplicar desde etapas iniciales del desarrollo vegetativo para potenciar el cierre de hileras cada 10-14 días. Repetir en verano junto con aplicaciones de Boro y/o fungicidas. Realizar 2-4 aplicaciones por temporada.
Papa		Aplicar durante todo el período de crecimiento vegetativo hasta antes de tuberización, repitiendo cada 10-14 días.

FORMATO 20 LITROS - 1000 LITROS

Fabricado por **REBISA (Resinas del Bio Bio S.A.)**,
Distribuido por **ADDVISE**



Mayor retorno de la inversión